

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

Matematică

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Test 16

- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

- Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
- Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL al II-lea și SUBIECTUL al III-lea

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	0	5p
2.	15	5p
3.	10	5p
4.	36	5p
5.	90	5p
6.	17	5p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.	Desenează triunghiul isoscel Notează triunghiul isoscel cu vârful A și baza BC	4p 1p
2.	$x = 3^{80} : 3^{76} - 10 = 3^4 - 10 = 81 - 10 = 71$ $y = 2^{40} (1 + 2 + 2^2) : 2^{38} + 1 = 2^2 \cdot 7 + 1 = 29$, deci media aritmetică a numerelor x și y este egală cu $m_a = \frac{x + y}{2} = \frac{71 + 29}{2} = 50$	2p 3p
3.	$\frac{30}{100} \cdot x + \frac{1}{2} \left(x - \frac{30}{100} \cdot x \right) + 350 = x$, unde x este lungimea traseului parcurs în cele trei zile $x = 1000$ km	3p 2p
4.	a) $a = \frac{10 + 15 + 24}{30} \cdot 30 =$ $= \frac{49}{30} \cdot 30 = 49$	3p 2p
	b) $b = \left(\frac{3}{3\sqrt{3}} - \frac{8}{2\sqrt{3}} + \frac{5}{5\sqrt{3}} \right) : \frac{\sqrt{3}}{12} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) : \frac{\sqrt{3}}{12} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{12}{\sqrt{3}} = -\frac{24}{3} = -8$ $(\sqrt{a} + b)^{2020} = (\sqrt{49} + (-8))^{2020} = (7 - 8)^{2020} = (-1)^{2020} = 1$	3p 2p
5.	$E(x) = 9x^2 - 6x + 1 - 7x^2 + 14x - 7x + 14 - x^2 - 6x - 9 = x^2 - 5x + 6$, pentru orice număr real x Cum $E(2) = 0$, obținem $E(0) \cdot E(1) \cdot E(2) \cdot \dots \cdot E(2020) = 0$	3p 2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.	a) $ABCD$ este dreptunghi, deci $P_{ABCD} = 2(AB + BC) =$ $= 2(10 + 6) = 32$ cm	3p 2p
	b) $MCDP$ este dreptunghi, unde $MP \perp AD$ și $P \in AD$, deci $MP = 6$ cm și $DP = 2$ cm, deci $NP = 6$ cm, de unde obținem că $\triangle MNP$ este dreptunghic isoscel, deci $m(\angle MNP) = 45^\circ$ $\triangle DEN$ este dreptunghic în E și $m(\angle DNE) = 45^\circ$, deci $\triangle DEN$ este dreptunghic isoscel	3p 2p

	c) $DN \parallel BM$, deci $\sphericalangle DNE \equiv \sphericalangle BMF$ și, cum $DN = BM$ și triunghiurile DNE și BMF sunt dreptunghice, obținem $\triangle DNE \equiv \triangle BMF$ $DE \perp MN$, $BF \perp MN \Rightarrow DE \parallel BF$ și, cum $DE = BF$, obținem că $BEDF$ este paralelogram	3p 2p
2.	a) $ABCD$ este pătrat, deci $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} =$ $= \sqrt{100 + 100} = 10\sqrt{2}$ cm	3p 2p
	b) M , N sunt mijloacele segmentelor BC , respectiv CD , deci MN este linie mijlocie în $\triangle BCD$ și M , P sunt mijloacele segmentelor BC , respectiv CV , deci MP este linie mijlocie în $\triangle VBC$ $MN \parallel BD$, $MP \parallel BV$, $MN \cap MP = \{M\}$ și $BD \cap BV = \{B\}$, deci $(MNP) \parallel (BDV)$	2p 3p
	c) $VO \perp (ABC) \Rightarrow m(\sphericalangle(VM, (ABC))) = m(\sphericalangle(VM, OM)) = m(\sphericalangle VMO)$ OM este linie mijlocie în $\triangle ABC$, deci $OM = 5$ cm și, cum $VO = 5\sqrt{3}$ cm și $\triangle VOM$ este dreptunghic, obținem $\operatorname{tg}(VMO) = \frac{VO}{OM} = \sqrt{3}$, deci $m(\sphericalangle VMO) = 60^\circ$	2p 3p